

UCBVET

Catálogo de Produtos Pet



ucbvet

saúde animal



Ivermectan Pet



COMPRIMIDOS
PALATÁVEIS

Ivermectan Pet é indicado para cães nos seguintes tratamentos: Sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*), Sarna demodécica (*Demodex canis*), verminoses gastrintestinais causadas por *Ancylostoma sp.*, *Toxocara canis* e *Trichuris sp.*

Modo de uso e dosagem: Administrar por via oral.
Sarna sarcóptica: 0,2 mg/Kg a cada 7 dias, em um total de 4 administrações.
Sarna demodécica: 0,5 mg/Kg uma vez por dia, durante 60 dias, podendo estender por até 90 dias a critério do Médico Veterinário.
Verminoses intestinais: 0,2 mg/Kg a cada 7 dias, em um total de 2 administrações.

Apresentações: Cartuchos de 3, 6 e 12 mg contendo 4 comprimidos cada e displays de 3, 6 e 12 mg contendo 5 strips com 4 comprimidos cada.

Formulação:

Ivermectan Pet 3 mg

Cada comprimido contém:

Ivermectina..... 3 mg
Excipiente q.s.p..... 130 mg

Ivermectan Pet 6 mg

Cada comprimido contém:

Ivermectina..... 6 mg
Excipiente q.s.p..... 260 mg

Ivermectan Pet 12 mg

Cada comprimido contém:

Ivermectina..... 12 mg
Excipiente q.s.p. 520 mg



Sarna
demodécica



Sarna
sarcóptica



Vermes
intestinais

Timbaco Spray



Indicado para tratamento de diversas formas de sarnas clínicas em cães (exceto demodécica).

Modo de uso e dosagem: Aplicar o produto puro nas regiões afetadas. Em caso de banhos, diluir 15 mL em 1L de água.

Apresentação: Frasco contendo 100 mL, com válvula tipo pump.

Formulação: Cada 100 mL contém:
Benzoato de Benzila 10 mL
Veículo q.s.p. 100 mL

Sartop Spray



Indicado no tratamento de cães e gatos acometidos por sarnas sarcópticas (*Sarcoptes scabiei*).

Modo de uso: Aspergir a parte afetada e arredores, mantendo o frasco na posição vertical a uma distância de 10 a 15 cm. Aplicar o produto uma vez ao dia até o desaparecimento das lesões ou a critério do Médico Veterinário.

Apresentação: Frasco contendo 100 mL, com válvula tipo pump.

Formulação: Cada 100 mL contém:
Monossulfureto de tetraetiltiuran (sulfiram)..... 3 g
Veículo q.s.p. 100 mL

Charmdog Carrapaticida e Sarnicida



Indicado para cães como carrapaticida, sarnicida (inclusive demodécica) e piolhícida.

Modo de uso e dosagem: Diluir 20 mL para cada 10 litros de água e molhar toda a superfície do corpo do animal, por intermédio de banho ou pulverização, e deixar secar.

Apresentação: Frascos contendo 20 mL.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Amitraz 12,5 g

Veículo q.s.p. 100 mL

Doxymax Pet



Doxymax Pet é indicado para cães no tratamento de infecções causadas por microrganismos sensíveis à doxiciclina, inclusive os intracelulares, como é o caso da Erliquiose canina (*Ehrlichia canis*), e infecções causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp*, *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Klebsiella pneumoniae* e *Leptospira interrogans* sorovar canicola.

Modo de uso e dosagem: Doxymax Pet deve ser administrado na dose de 5 mg/Kg de peso corpóreo, a cada 12 horas, durante 7 dias consecutivos. Para a Erliquiose canina o tratamento será por 21 dias ou a critério do Médico Veterinário.

Apresentações: Cartuchos de 25, 50 e 100 mg, contendo 14 comprimidos cada e displays de 25, 50 e 100 mg contendo 5 strips com 14 comprimidos cada.

Formulação:

Doxymax Pet 25 mg

Cada comprimido contém:

Hiclato de doxiciclina.....	28,85mg*
Excipiente q.s.p.....	150 mg
(*equivalente a 25 mg de doxiciclina base)	

Doxymax Pet 50 mg

Cada comprimido contém:

Hiclato de doxiciclina	57,50 mg*
Excipiente q.s.p.....	300 mg
(*equivalente a 50 mg de doxiciclina base)	

Doxymax Pet 100 mg

Cada comprimido contém:

Hiclato de doxiciclina	115,40 mg*
Excipiente q.s.p.....	600 mg
(*equivalente a 100 mg de doxiciclina base)	

Falexyl



Indicado para cães no tratamento de infecções causadas por micro-organismos sensíveis às cefalexinas

Modo de uso e dosagem:

Administrar por via oral, **30mg/Kg de 12 em 12 horas**, durante **7 a 30 dias**, ou de acordo com o médico veterinário.



Comprimido	75mg 	300mg 	600mg 
1/2 comprimido	1,25 Kg	5,0 Kg	10,0 Kg
1 comprimido	2,5 Kg	10 Kg	20,0 Kg

Apresentações:

- Cefalexina Monohidratada 75mg - cartucho com 14 comprimidos
- - display com 70 comprimidos (5x14)
- Cefalexina Monohidratada 300mg - cartucho com 14 comprimidos
- - display com 70 comprimidos (5x14)
- Cefalexina Monohidratada 600mg - cartucho com 14 comprimidos
- - display com 70 comprimidos (10x7)

Infectrat

COMPRIMIDOS
PALATÁVEIS



Infectrat é indicado para cães no tratamento de infecções causadas por microrganismos sensíveis à enrofloxacin, tais como: *Staphylococcus intermedius*; *Staphylococcus aureus*; *Staphylococcus epidermitis*; *Streptococcus canis*; *Escherichia coli*; *Proteus mirabilis*; *Bordetella bronchiseptica* (Tosse dos cães); *Pasteurella multocida* e *Mycoplasma canis*. Normalmente estes agentes são responsáveis pelas infecções respiratórias, dérmicas, geniturinárias, gastrintestinais e auriculares (otites).

Modo de uso e dosagem: Administrar por via oral 5 mg/Kg de peso corpóreo, uma vez ao dia, durante 5 dias ou a critério do Médico Veterinário.

Apresentações: Cartuchos de 25 e 50 mg contendo 10 comprimidos cada, cartuchos de 100 mg contendo 6 comprimidos.

Formulação:

Infectrat 25 mg

Cada comprimido contém:

Enrofloxacin (HCl).....27,54 mg*

Excipiente q.s.p150 mg

(*equivalente a 25 mg de enrofloxacin base)

Infectrat 50 mg

Cada comprimido contém:

Enrofloxacin (HCl).....55,07 mg*

Excipiente q.s.p300 mg

(*equivalente a 50 mg de enrofloxacin base)

Infectrat 100 mg

Cada comprimido contém:

Enrofloxacin (HCl).....110,14 mg*

Excipiente q.s.p600 mg

(*equivalente a 100 mg de enrofloxacin base)

Meloxytrat



Meloxytrat é indicado para cães como antipirético e anti-inflamatório, principalmente nos casos relacionados ao sistema musculoesquelético.

Modo de uso e dosagem: Administrar o Meloxytrat por via oral, na dose de 0,1 mg/Kg de peso corpóreo, uma vez ao dia. A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro e a critério do Médico Veterinário.

Apresentações: Cartuchos de 1 e 2 mg, contendo 10 comprimidos cada e displays de 1 e 2 mg, contendo 5 strips com 10 comprimidos cada.



Fórmula:

Meloxytrat 1 mg

Cada comprimido contém:

Meloxicam 1 mg

Excipiente q.s.p. 125 mg

Meloxytrat 2 mg

Cada comprimido contém:

Meloxicam 2 mg

Excipiente q.s.p. 250 mg

Cortvet Pet



Cortvet Pet é indicado para cães como anti-inflamatório em condições inflamatórias diversas, pois inibe a Prostaglandina E2 e a quantidade de exsudato inflamatório. A dexametasona é excelente em casos de afecções cutâneas e reações de hipersensibilidades.

Modo de uso e dosagem: Administrar por via oral. A posologia adequada deverá ser determinada de acordo com o porte do animal e com a gravidade da afecção.

Apresentações: Cartuchos de 0,5 e 1 mg, contendo 10 comprimidos cada e displays de 0,5 e 1 mg, contendo 5 strips com 10 comprimidos cada.



Fórmula:

Cortvet Pet 0,5 mg

Cada comprimido contém:

Acetato de dexametasona 0,55 mg

Excipiente q.s.p. 125 mg

(*equivalente a 0,5 mg de dexametasona base)

Cortvet Pet 1 mg

Cada comprimido contém:

Acetato de dexametasona 1,11 mg*

Excipiente q.s.p. 250 mg

(*equivalente a 1,0 mg de dexametasona base)

Cortvet

Cortvet é um potente anti-inflamatório de ação rápida, indicado em todos os quadros clínicos que necessitam de uma resposta imediata.

Indicação:

Bovinos



Equinos



Suínos



FÓRMULA:

Cada 1 mL contém:

Dexametasona (fosfato dissódico)

2 mg

Veículo q.s.p

1 mL

PROPRIEDADES:

CORTVET® é composto por um análogo sintético da prednisolona, porém com atividade anti-inflamatória mais potente e com efeitos hormonais melhorados. A Dexametasona possui um efeito anti-inflamatório maior que os outros corticosteróides.

INDICAÇÕES:

CORTVET® está indicado em todos os casos que se faça necessário uma resposta hormonal imediata.

É indicado para inflamações que envolvam articulações e tendões como artrites, reumatismo, luxações, tendinites, sinovites e bursites. Também nos casos de alergias e dermatites inespecíficas.

- **Grandes animais:** Como auxiliar nos casos de mastites agudas, metrites, pneumonias graves, febre dos transportes e vitular, e cetose em bovinos.
- **Nos equinos** está indicado para casos de afecções do sistema músculo-esquelético como: mioosite, carpite, bursite, luxações e como medicação auxiliar na fadiga e exaustão devido ao calor.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

A via intravenosa só deve ser utilizada em casos de estado de choque, toxemia e crise circulatória.

- **Bovinos:** 2,5 a 10 mL por via intramuscular ou intravenosa de acordo com a gravidade do caso.
- **Equinos:** 1,25 a 2,5 mL por via intramuscular ou intravenosa.
- **Suínos:** 0,5 a 3 mL por via intramuscular ou intravenosa.

As doses devem ser repetidas se necessário a critério do Médico Veterinário.

Como qualquer corticosteróide a terapia deve ser estabelecida levando-se em conta a gravidade da afecção, a duração do tratamento e o limite de tolerância do paciente para este tipo de terapia, devendo-se sempre aplicar a menor dose efetiva possível.

APRESENTAÇÕES:

- Frasco-ampola com 10 mL.
- Frasco-ampola com 50 mL.

Therax Plus



Therax Plus® é um vermífugo de amplo espectro de ação indicado para cães.

Formulação: Cada comprimido contém:

Therax Plus 660 mg:

Praziquantel 50 mg
Pamoato de Pirantel 144 mg
Febantel 150 mg
Excipiente.q.s.p 660 mg

Therax Plus 1320 mg:

Praziquantel 100 mg
Pamoato de Pirantel 288 mg
Febantel 300 mg
Excipiente.q.s.p 1320 mg

Apresentações: Cartuchos de 660 e 1320 mg, contendo 4 comprimidos cada e displays de 660 e 1320 mg contendo 12 cartuchos.

Quando realizar a vermifugação?

Cães adultos a cada 3 meses.

As fêmeas antes das coberturas e 10 dias antes do parto.

Filhotes com 2, 4, 8 e 12 semanas de vida e aos 4, 5 e 6 meses.

Modo de uso e dosagem: Therax Plus® deve ser administrado por via oral em dose única, não requer jejum prévio.

THERAX PLUS	COMPRIMIDO	
	1/2	1
660 mg	5 kg	10 kg
1320 mg	10 kg	20 kg

Therax Puppy



Apresentações: Frasco plástico de 20 mL, acompanhado de seringa dosadora.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Febantel.....	1,50 g
Pamoato de pirantel.....	1,44 g
Praziquantel.....	0,50 g
Veículo q.s.p.....	100 mL

Therax Puppy® é um anti-helmíntico de amplo espectro para cães, contendo em sua fórmula a associação dos princípios ativos febantel, pamoato de pirantel e praziquantel. Esta combinação promove sinergismo de atuação no combate dos parasitas mais comuns dos cães: vermes redondos, chatos e ainda a Giardíase.

Modo de uso e dosagem: Therax Puppy® deve ser administrado na dose de 1 mL por quilo de peso corpóreo. Para tratamento anti-helmíntico deve ser administrado em dose única, via oral, utilizando a seringa dosadora. Uma segunda dose deverá ser administrada 15 dias após a primeira dose. Para tratamento de infecções causadas por *Giardia spp*, deverá ser administrado, via oral, por três dias consecutivos utilizando a seringa dosadora. A posologia pode ser alterada a critério do Médico Veterinário.

Antitóxico UCB Oral



É indicado para cães e gatos como hepatoprotetor nas intoxicações medicamentosas, por plantas tóxicas, ingestão de alimentos contaminados ou produtos tóxicos. Auxilia também no tratamento de afecções hepáticas causadas por doenças infecciosas. Possui ação lipotrópica nas infiltrações gordurosas do fígado.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Acetilmetionina	7 g
Colina (cloreto)	4 g
Lisina (cloridrato)	0,5 g
Riboflavina (fosfato)	0,05 g
Piridoxina (cloridrato)	0,25 g
Nicotinamida	1 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Modo de uso e dosagem: Cães e gatos de até 10 Kg: 20 gotas (1 mL). Mais de 10 Kg: 20 gotas (1 mL) para cada 10 Kg. Administrar 3 vezes ao dia.

Apresentação: Frasco conta-gotas com 20 mL.

Nausetrat Injetável

Indicado no tratamento de distúrbios digestivos. Possui atividade reguladora eletiva sobre o trato digestório, controlando náuseas, vômitos, meteorismo, espasmos pilóricos, soluço persistente, intolerância digestiva e medicamentosa.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Cloridrato de metoclopramida 500 mg
Veículo q.s.p. 100 mL

Modo de uso e dosagem:

A dose recomendada para cães é de 0,1 mL (equivalente a 0,5 mg de metoclopramida) por Kg de peso corpóreo.

A duração do tratamento deverá ser a critério do Médico Veterinário



Apresentação:

Frasco-ampola com 10 mL.

Nausetrat Oral

Indicado no tratamento de distúrbios digestivos. Possui atividade reguladora eletiva sobre o trato digestório, controlando náuseas, vômitos, meteorismo, espasmos pilóricos, soluço persistente, intolerância digestiva e medicamentosa.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Cloridrato de metoclopramida 500 mg
Veículo q.s.p. 100 mL

Modo de uso e dosagem:

Caninos e felinos: 1 gota por 1 Kg de peso corpóreo, 3 vezes ao dia.



Apresentação:

Frasco conta-gotas com 20 mL.

Otodex



Indicado para cães ou gatos no tratamento de otites agudas ou crônicas, causadas por fungos e/ou bactérias associadas ou não à inflamação. Cânula otológica silenciosa, que possibilita a aplicação da dose correta para preencher todo o conduto auditivo em qualquer posição que o animal esteja, oferecendo um tratamento sem estresse para o pet.

Formulação: Cada mL contém:

Enrofloxacin	2,33 mg
Clotrimazol	10 mg
Betametasona	1,32 mg
Veículo q.s.p.	1,00 mL

Modo de uso e dosagem:

Aplicar o produto no conduto auditivo do animal, massageando em seguida a base da orelha para melhor distribuição do medicamento.

CÃES

Menos de 7 kg: 1 borrifada a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

Entre 7 e 14 kg: 2 borrifadas a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

Acima de 14 kg: 3 borrifadas a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

GATOS

Até 7 kg: 1 borrifada a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

Acima de 7 kg: 2 borrifadas a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

Apresentação:

Frasco de 30 mL com cânula otológica.

Otolin



Indicado no tratamento de infecções auriculares, como otites e otorreias em cães e gatos.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Sulfametazina sódica	4 g
Ácido bórico	1,66 g
Cloridrato de procaína	1 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Modo de uso e dosagem: Aplicar de 3 a 5 gotas no conduto auditivo, 2 vezes ao dia, até a melhora dos sintomas ou de acordo com o Médico Veterinário.

Apresentação: Frasco contendo 15 mL, com aplicador auricular.

Ceruclean



Indicado para limpeza e desinfecção do conduto auditivo e pavilhão auricular dos cães e gatos, com substâncias que removem o excesso de cerúmen acumulados no ouvido.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Ácido bórico.....	2,36 g
Mentol.....	0,91 g
Polissorbato 80.....	2,00 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Modo de uso e dosagem: Instilar de 5 a 10 gotas no conduto auditivo do animal

e massagear com movimentos delicados na base da orelha. Remova a secreção e sujeira com auxílio de algodão ou gaze. Caso necessário, repita o procedimento até que o ouvido esteja limpo e seco.

Apresentação: Frasco de 100 mL com aplicador auricular.



Colírio UCB



Indicado nas inflamações e irritações dos olhos, como conjuntivite catarral aguda ou crônica.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Sulfato de zinco	0,5 g
Sulfato de cobre	0,5 g
Cloridrato de amônio	1,66 g
Ácido bórico	1,66 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Modo de uso e dosagens: Instilar 3 a 5 gotas no olho afetado duas ou mais vezes ao dia, dependendo da gravidade do caso, ou de acordo com o Médico Veterinário.

Apresentação: Frasco conta-gotas com 15 mL.

Visione



Indicado para o tratamento de infecções oculares bacterianas, como conjuntivites, ceratoconjuntivites e queratites em cães causadas pelas bactérias: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Klebsiella pneumoniae* e *Morganella morganii*, e em gatos nas infecções oculares causadas pelas bactérias: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Klebsiella pneumoniae* e *Morganella morganii*.

Formulação:

Cada 1,0 mL contém:

Tobramicina.....3,0 mg

Excipiente q.s.p..... 1,0 mL

Modo de uso e dosagens: Uso exclusivamente oftálmico. A dose recomendada para cães e gatos é de uma gota em cada olho, a cada 12 horas. A duração do tratamento pode variar entre 10 a 14 dias.

Apresentações: Frasco conta-gotas com 5 mL.

Allequa



Indicado para a limpeza ocular de cães e gatos. Alivia a irritação, o ardor e a secura ocular, geralmente causados pela exposição ao vento, ao sol, ao calor e ao ar seco. Pode ser utilizado também para a limpeza de secreções antes do uso do colírio terapêutico.

Formulação: Cada 10 mL contém:

Álcool polivinílico 0,140 g

Cloreto de sódio 0,55 g

Cloreto de potássio 0,008 g

Citrato de sódio 0,017 g

Excipiente q.s.p 10 mL

Modo de uso e dosagens: Uso tópico oftálmico. Instilar 1 a 2 gotas de Allequa no(s) olho(s) afetado(s), 4 vezes ao dia ou sempre que necessário ou de acordo com as recomendações do Médico Veterinário.

Apresentações: Frasco conta-gotas com 10 mL.

Anticion



Inibidor de cio em cadelas e gatas nos casos em que uma possível gestação ou cirurgia de castração possam ser um risco para o animal.

Formulação: Cada 100 mL contém:

Acetato de medroxiprogesterona5 g

Veículo q.s.p.100 mL

Modo de uso e dosagem: Administrar no período do anestro, 1 mL, por via subcutânea.

Apresentações: Ampolas de 1 mL; cartela contendo uma ampola com 1 mL e uma seringa estéril.



Phenodral

Phenodral é um tônico estimulante das funções metabólicas de animais de produção e performance. Contribui para o aumento do apetite e formação da hemoglobina, responsável pela absorção e transporte de oxigênio do sangue aos tecidos, proporcionando a melhora do desempenho de animais tratados.



Indicação:

Bovinos



Equinos



APRESENTAÇÕES:

- Display com 3 ampoules de 15 mL.

Phenodral

FÓRMULA:

Cada 15 mL contém:

Metilarsinato de sódio
Citrato de ferro amoniacal marrom
Solução millesimal de adrenalina
Veículo aquoso q.s.p

300 mg
300 mg
1,5 mL
15 mL

PROPRIEDADES:

PHENODRAL® é uma associação de um arsenical orgânico com sais de ferro adrenalina, estimulantes das funções vitais do metabolismo animal. O metilarsinato de sódio tem a propriedade de estimular o metabolismo promovendo desta forma um aumento de apetite e a adrenalina um estimulante cardiovascular e finalmente o citrato de ferro amoniacal que fornece o ferro ao organismo animal para a formação de hemoglobina.

INDICAÇÕES:

Bovinos e equinos.

PHENODRAL® é indicado como tônico reconstituente, como estimulante das funções metabólicas nos casos de anorexia (falta de apetite), desnutrição, anemias e nas convalescenças de enfermidades parasitárias e infecciosas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrar preferencialmente por via endovenosa, injetando o líquido vagarosamente. Na impossibilidade de ser endovenosa, aplicar por via intramuscular profunda, de preferência em locais em que os animais apresentem grandes massas musculares, como quarto traseiro, sempre utilizando agulhas longas, e friccionando vigorosamente o local após a aplicação do produto.

- Bovinos e equinos adultos: 15 mL
- Bezerros e potros: 5 mL
- Tratar em 3 doses, uma a cada 5 dias, podendo repetir a intervalos de 15 dias

Placentina

Placentina promove o aumento das contrações da musculatura uterina no momento do parto, ajudando na expulsão do feto e da placenta, facilitando o trabalho de parto. No pós-parto imediato, contribui para a expulsão das secreções patológicas contidas no útero (restos placentários). Atua também sobre as glândulas mamárias, por meio de aumento das contrações da musculatura lisa dos canais galactóforos, impulsionando o leite e aumentando seu fluxo.



Indicação:

Bovinos



Equinos



Suínos



Ovinos



Caprinos



ADMINISTRAÇÃO:

Aplicar por via subcutânea após os devidos cuidados de assepsia.

DOSAGEM:

Vacas e éguas	3 a 10 mL
Porcas	1 a 3 mL
Ovelhas e cabras	2 a 5 mL

CONTRAINDICAÇÕES:

É contraindicado em partos distócicos ou em obstruções mecânicas.

Placentina

FÓRMULA:

Cada 1 mL contém:

Ocitocina sintética
Veículo estabilizante q.s.p

8 UI
1 mL

PROPRIEDADES:

A ocitocina é um hormônio que promove o aumento das contrações de toda a musculatura lisa do útero no momento do parto, ajudando a expulsão do feto e da placenta e controlando a hemorragia. Age também nas glândulas mamárias, por meio do aumento das contrações da musculatura lisa dos canais galactóforos, impulsionando o leite contido nos alvéolos para as cisternas, aumentando deste modo o fluxo de leite.

INDICAÇÕES:

Atonia uterina: promove contrações do útero durante o parto para expulsão do feto ou da placenta (retenção de placenta). Deve ser utilizada somente em casos de partos normais. É contraindicada em casos de partos distócicos ou em casos de obstrução mecânica.

Metrites e piometras: ajuda na expulsão das secreções patológicas contidas no útero.

Hemorragia pós-parto: indicado como coadjuvante.

Retenção de leite: para favorecer o início da lactação.

Verrutrat

Indicado no tratamento da papilomatose ou figueira dos animais.

Indicação:

Bovinos



Suínos



Ovinos



FÓRMULA:

Cada frasco-ampola de 20 mL contém:

Clorobutanol	5 g
Veículo oleoso q.s.p	20 mL

MODO DE AÇÃO:

O clorobutanol provavelmente age no metabolismo do vírus causador da papilomatose, impedindo o seu crescimento. O clorobutanol também tem um alto poder antisséptico e também é anestésico local fazendo com que a aplicação do produto seja indolor. Após a aplicação as verrugas desaparecem num espaço de tempo que varia entre 15 dias a 60 dias sem deixar cicatrizes e sem o aparecimento de recidivas.

INDICAÇÕES:

No tratamento de papilomatose (verruga) ou figueira dos animais.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

- Aplicar no animal por via subcutânea no local do papiloma(verruga). Usar de preferência agulha grossa (calibre 8) e de comprimento 10mm.
- A dose a ser aplicada é de 1 mL para cada 20 kg de peso corpóreo do animal.
- Nas verrugas pequenas e grande a dosagem deve ser repetida após 7 dias da primeira aplicação.
- Modificações na posologia e modo de usar poderão ser feitas segundo critério do médico veterinário.

APRESENTAÇÃO:

Frasco-ampola com 20 mL.

Pomadol

Pomada cicatrizante com ação antimicrobiana nos casos de ferimentos, lacerações, abscessos, rachadura nos tetos, descornas, queimaduras e outras dermatites.

Indicação:

Equinos



FÓRMULA:

Cada 100 g contém:

Sulfanilamida	10g
Óxido de Zinco	20g
Óleo de Fígado de Bacalhau	10g
Cânfora	2g
Excipiente q.s.p.	100 g

PROPRIEDADES:

Pomadol® contém em sua formulação a Sulfanilamida, que possui atividade bacteriostática que impede o crescimento e reprodução de bactérias. O Óxido de Zinco possui atividade adstringente, absorvente e secante sobre as secreções das feridas ajudando a cicatrização das mesmas. A Cânfora com ação analgésica, antisséptica e antipruriginosa proporciona um certo alívio sobre a dor e a coceira. O Óleo de Fígado de Bacalhau é rico em vitamina A e D e ácidos graxos insaturados que são elementos de grande importância para a cicatrização e epitelização dos tecidos lesados.

INDICAÇÕES:

Pomadol® é indicada como anti-infecciosa e cicatrizante nos casos de ferimentos antigos ou recentes, com ou sem supuração, como furúnculos, abscessos, flegmões, queimaduras, eczemas e outras dermatites.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Uso Externo.

Antes das aplicações, os locais devem ser lavados com água e sabão e ou soluções antissépticas, como água oxigenada, em casos de lesões que apresentem exsudatos. Em seguida, o local deverá ser enxugado, aplicando-se então a pomada sobre o local. As aplicações deverão ser feitas diariamente, sempre precedida de limpeza local, até a cura definitiva.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 1 bisnaga plástica com 50g.

Bubble Dry

O segredo nanotecnológico
para pele e pelos saudáveis

Lançamento



ucbvet
saúde animal

Reposição da barreira cutânea e adjuvante no manejo dos sintomas da Dermatite Atópica Canina (DAC).

O uso de shampoos a seco ganhou espaço na medicina veterinária, com boa aceitação dos tutores, como alternativa ao banho com água para agilizar a higienização do animal, o que permite, minimizar o estresse e criar momentos de interação carinhosa entre pet e tutor. Atualmente, há shampoos a seco que também auxiliam na reposição da barreira cutânea e no controle do microbioma, especialmente em cães alérgicos com a condição clínica de Dermatite Atópica Canina (DAC).

A DAC é uma doença inflamatória crônica da pele dos cães, de origem hereditária, muito comum, que ocasiona inflamação cutânea predispondo a infecções secundárias da pele e dos ouvidos por bactérias e fungos, desencadeada pela hipersensibilidade a alérgenos ambientais, alimentares ou microbianos pertencentes à pele dos cães, como agentes estafilocócicos, *Malassezia sp.* ou infecções mistas entre os patógenos (Marsella et al, 2012; Hensel P et al, 2015; Nuttall T et al, 2019).



PELE SAUDÁVEL



PELE DANIFICADA

Ilustração: Pele saudável e hidratada - não há penetração de irritantes alérgenos e não há perda de água através da epiderme. **Pele danificada** - há alteração da barreira cutânea e há penetração dos alérgenos, como: bactérias, leveduras e outras substâncias, além da perda de água.

A barreira cutânea é composta por queratinócitos do estrato córneo, envoltos por lamelas lipídicas contendo colesterol e seus ésteres, ácidos graxos livres e ceramidas. A função de uma barreira saudável é manter a pele hidratada, evitando a perda de água transepidermal e evitar a penetração de proteínas alergênicas e microbianas na pele (Santoro et al, 2015).

A patogênese da DAC envolve o defeito da barreira cutânea, produzindo cerca de 40 a 60% menos ceramidas. Esta condição também está associada à disbiose, desequilíbrio da microbiota cutânea que favorece a adesão de microorganismos e a penetração de proteínas alergênicas, dando início a respostas inflamatórias e alérgicas anormais, envolvendo resposta Th1, Th2, Th17 e Th22 que culminam com a liberação de diversas citocinas inflamatórias, como IL-4, IL-5, IL-6, IL-13 e IL-31. Esse processo desencadeia sintomas como prurido, eritema, hiperqueratose, edema cutâneo, formação de pápulas, úlceras, crostas, lambadura podal, pododermatite, otite externa e infecções secundárias (Marsella et al, 2012; Olivry et al, 2016; Nuttall T et al, 2019).



O **Bubble Dry** é um produto desenvolvido para higienização, hidratação e desodorização dos cães de forma rápida e prática. Ideal para os momentos em que não é possível o banho completo com água, como em dias frios, durante viagens e nos intervalos entre os banhos. Este produto é composto por óleos vegetais nanoencapsulados, além de D-pantenol, que são indicados para hidratação profunda dos pelos e pele.

Combinação de nanotecnologia para pele e pelos saudáveis e adjuvante no controle do prurido.

O blend de óleos vegetais do **Bubble Dry** aumenta a hidratação da pele com ressecamento moderado à grave (xerodermia) e os níveis de lipídeos da superfície cutânea.



Os **óleos nanoencapsulados** promovem maior penetração e liberação prolongada dos princípios ativos, permitindo resultados mais duradouros.



O **óleo de coco** previne a quebra dos fios causada pela escovação e reduz a perda proteica, aumentando significativamente a hidratação cutânea e seus níveis lipídicos (Agero et al, 2004).



A composição do **óleo de argan** inclui ácido oleico, ácido linoleico, ácido palmítico e ácido esteárico, além de carotenos, tocoferóis, triterpenos e outros (Charrouf et al, 2008). Devido ao alto teor de ácidos graxos insaturados e antioxidantes, o óleo de argan possui excelente atividade hidratante, além de auxiliar na restauração e fortalecimento da barreira cutânea (Guillaume et al, 2011).



O **óleo de abacate** é rico em ácidos graxos insaturados, principalmente ácido oleico, palmítico e linoleico, além de apresentar carotenóides, polifenóis, tocoferóis e fitoesteróis (Qin et al, 2016). O uso tópico possui efeito emoliente sendo indicado para nutrição da pele seca e danificada, além de estimular a síntese de colágeno e diminuir o processo inflamatório durante a cicatrização cutânea (Oliveira et al, 2013).



O **óleo essencial de melaleuca** é um ativo de origem natural cujo principal constituinte (4-terpineol) apresenta forte atividade anti-inflamatória e antimicrobiana, atuando contra bactérias, vírus e fungos. Possui potencial aplicação no tratamento de doenças cutâneas, tais como dermatite localizada com prurido, infecções de ouvido e infecções fúngicas por *Malassezia pachydermatis*, além de reduzir a oleosidade da pele.



O **D-pantenol** é precursor da vitamina B5, um potente umectante da pele e dos pelos com propriedades antioxidantes, conferindo hidratação, proteção e brilho aos pelos.



Bubble Dry

O segredo nanotecnológico para pele e pelos saudáveis

Indicado para cães.

Uso tópico: agitar o produto antes de usar. Borrifar o produto sobre toda a pelagem do animal, massagear o local e remover o excesso do produto com uma toalha. Não precisa de enxágue.

Principais benefícios do Bubble Dry para uma pele saudável:



Auxilia na hidratação



Aumenta o nível de lipídeos na pele



Aumenta a síntese de colágeno



Auxilia na cicatrização



Reduz a inflamação da pele



Restaura a barreira cutânea



Auxilia na manutenção do microbioma saudável

Bubbly Dry é um produto indispensável para a hidratação e reparação da barreira cutânea de cães saudáveis e com dermatite atópica.

Limpeza e hidratação como cuidados fundamentais para os cães

Os cuidados com a higiene e hidratação da pele, maior órgão do corpo, podem auxiliar na **prevenção de doenças cutâneas**, como disqueratoses, distúrbios de oleosidade e atuar como terapia preventiva de crises alérgicas em cães atópicos. O reparo da barreira cutânea **pode minimizar a sensibilização alérgica** e quanto mais cedo ela é realizada na vida do cão, menor a intensidade dos sintomas alérgicos apresentados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Agero, A. L., and Verallo-Rowell, V. M., A randomized doubleblind controlled trial comparing extra virgin coconut oil with mineral oil as a moisturizer for mild to moderate xerosis, *Dermatitis* 3, 109-116, 2004.

Blaskovic M, Rosenkrantz W, Neuber A, et al. The effect of a spot-on formulation containing polyunsaturated fatty acids and essential oils on dogs with atopic dermatitis. *Vet J* 2014;199:39-43.

Belkaid Y, Segre JA. Dialogue between skin microbiota and immunity. *Science* 2014;346:954-959.

Charrouf, Z., and Guillaume, D., Argan oil: occurrence, composition and impact on human health, *Eur J Lipid Sci Technol* 7, 632-636, 2008.

Guillaume, D., and Charrouf, Z., Argan oil and other argan products: use in dermocosmetology, *Eur J Lipid Sci Technol* 4, 403-408, 2011.

Hensel P, Santoro D, Favrot C, et al. Canine atopic dermatitis: detailed guidelines for diagnosis and allergen identification. *BMC Vet Res* 2015;11:196-209. J.

Marsella R, Sousa CA, Gonzales AJ, et al. Current understanding of the pathophysiologic mechanisms of canine atopic dermatitis. *J Am Vet Med Assoc* 2012;241:194-207.

Oliveira, A. P., Franco, E. S., Barreto, R. R., Cordeiro, D. P., Melo, R. G., Aquino, C. M. F., Silva, A. A. R., Medeiros, P. L., Silva, T. G., Góes, A. J. S., and Maia, M. M. S., Effect of semisolid formulation of Persea americana Mill (avocado) oil on wound healing in rats, *Evid Based Complement Alternat Med* 2013.

Olivry T, Mayhew D, Paps JS, et al. Early activation of Th2 / Th22 inflammatory and pruritogenic pathways in acute canine atopic dermatitis skin lesions. *J Invest Dermatol* 2016;136:1961-1969.

Santoro D, Marsella R, Pucheu-Haston CM, et al. Review: pathogenesis of canine atopic dermatitis: skin barrier and host-microorganism interaction. *Vet Dermatol* 2015;26:84-94.

Nuttall T, Nuttall J, Marsella R, Rosenbaum MR, Gonzales AJ, Fadok VA. Update on pathogenesis, diagnosis, and treatment of atopic dermatitis in dogs. *JAVMA*, Jun 2019, v. 254:1291-1300.

Qin, X., and Zhong, J., A review of extraction techniques for avocado oil, *J Oleo Sci* 11, 881-888, 2016.

Siga-nos:



Fale Conosco:

0800 160 00 24

